

新北市教(托)育機構腸病毒防治通知單【一般版】

親愛的家長您好：

目前時節已進入腸病毒流行期，由於在學校/機構裡孩子們接觸及互動頻繁，請讓孩子們養成正確洗手等衛生習慣，且毛巾、手帕等需保持清潔；玩具應定期清洗、消毒，並避免幼兒將其放入口中；均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以增強免疫力，若出現疑似腸病毒感染症狀請儘速就醫並在家中休息。



腸病毒小百科

- 經由腸胃道、呼吸道傳染，接觸患者糞便、口鼻分泌物及皮膚上潰瘍水泡等途徑傳染。
- 潛伏期平均為3至5天，在發病前數天即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強。
- 多為無症狀感染或似一般感冒症狀，常引起的症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。
- 出現下列任一重症前兆，請儘速帶孩子至大醫院就醫。
 - (1)嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
 - (2)肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
 - (3)持續嘔吐
 - (4)呼吸急促或心跳加快



預防小叮嚀



- 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
- 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以增強免疫力。
- 生病時應儘速就醫，並請假在家休息。
- 注意環境的衛生清潔及通風。
消毒建議請參見背面說明
- 流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
- 儘量不要與疑似腸病毒感染病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童需特別注意。
- 兒童玩具(尤其帶毛玩具)經常清洗、消毒。
- 大人返家後，記得先洗手及換衣物再接觸幼童。

更多的腸病毒防疫資訊，可至：新北市政府衛生局網站/疾病防疫專區/腸病毒防治查詢



確---認---回---條

教托育機構章戳

家長簽名



新北市政府衛生局 關心您
Department of Health, New Taipei City Government



漂白水 稀釋與泡製方法

★一般環境消毒，請使用500ppm濃度之漂白水

★嘔吐物或排泄物汙染之物品或表面，請使用1,000ppm濃度之漂白水進行消毒

市售漂白水 濃度	500ppm		1,000ppm	
	漂白水(ml)	清水(公升)	漂白水(ml)	清水(公升)
5%~6%	100	10	200	10
8%	62.5	10	125	10
10%	50	10	100	10
12%	42	10	84	10

※請使用有刻度之量杯正確量測漂白水與清水，兩者混合且均勻攪拌後，於24小時內使用完畢。

※請以抹布或拖把沾取稀釋後漂白水做擦拭、消毒，靜待30分鐘後再用清水擦拭。

※使用稀釋漂白水執行清潔、消毒工作時，保持環境通風，並請配戴口罩與手套，以免刺激皮膚。



新北市政府衛生局 關心您
Department of Health, New Taipei City Government

健康・幸福・新北市

防疫諮詢專線：02-22586923 <http://www.health.ntpc.gov.tw>

新北市教(托)育機構腸病毒防治通知單【加強版】

親愛的家長您好：

本機構一週內同一班級有2名以上(含2名)有疑似感染腸病毒幼(學)童，於____年____月____日由衛生所防疫人員至機構內進行衛教輔導及檢查。並同時提醒您：由於在學校裡孩子們接觸及互動頻繁，且感染後有3~5天的潛伏期，請家長多留意觀察孩子，是否出現疑似腸病毒感染症狀，例如：手足口症(發燒、手腳及臀部周圍出現紅疹、小水泡及口腔潰瘍)或疱疹性咽峽炎(突然發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍)，若出現類似症狀請儘速就醫並在家中休息。

腸病毒小百科

- ◎ 經由腸胃道、呼吸道傳染，接觸患者糞便、口鼻分泌物及皮膚上潰瘍水泡等途徑傳染。
- ◎ 潛伏期平均為3至5天，在發病前數天即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強。
- ◎ 多為無症狀感染或似一般感冒症狀，常引起的症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。
- ◎ 出現下列任一重症前兆，請儘速帶孩子至大醫院就醫。
 - (1)嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
 - (2)肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
 - (3)持續嘔吐
 - (4)呼吸急促或心跳加快

腸病毒消毒小訣竅

- ◎ 食物經過加熱處理，或將內衣褲浸泡熱水，都可以有效減少腸病毒傳播。
- ◎ 腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性(如清潔消毒劑及酒精)，無法殺死腸病毒。
- ◎ 稀釋含氯漂白水消毒最有效(詳細漂白水稀釋與泡製方法請見背面說明)：
 - 一般環境消毒，建議使用500ppm濃度。
 - 針對病童嘔吐物或排泄物污染之物品或表面，建議使用1000ppm之漂白水。

更多的腸病毒防疫資訊，可至：新北市政府衛生局網站/疾病防疫專區/腸病毒防治查詢



確---認---回---條

教托育機構章戳

家長簽名



新北市政府衛生局 關心您
Department of Health, New Taipei City Government



漂白水 稀釋與泡製方法

★一般環境消毒，請使用500ppm濃度之漂白水

★嘔吐物或排泄物汙染之物品或表面，請使用1,000ppm濃度之漂白水進行消毒

市售漂白水 濃度	500ppm		1,000ppm	
	漂白水(ml)	清水(公升)	漂白水(ml)	清水(公升)
5%~6%	100	10	200	10
8%	62.5	10	125	10
10%	50	10	100	10
12%	42	10	84	10

※請使用有刻度之量杯正確量測漂白水與清水，兩者混合且均勻攪拌後，於24小時內使用完畢。

※請以抹布或拖把沾取稀釋後漂白水做擦拭、消毒，靜待30分鐘後再用清水擦拭。

※使用稀釋漂白水執行清潔、消毒工作時，保持環境通風，並請配戴口罩與手套，以免刺激皮膚。



新北市政府衛生局 關心您
Department of Health, New Taipei City Government

健康·幸福·新北市
防疫諮詢專線：02-22586923 <http://www.health.ntpc.gov.tw> 廣告